
verificatiearteriële pulsaties
monitorbeeld / defibrillator opladen tot 200 j
VF/VT zonder pulsaties
EMD:adequaat ritme zonder pulsaties
ASYSTOLE
SHOCK-SCENARIO
NO SHOCK-SCENARIO
NO SHOCK-SCENARIO
1e SHOCK BLOK 200 j 200 j - 360 j
1e no-shock blok
• beademing
• hartmassage
• intubatie
• (centraal) infuus
• noradrenaline 1 mg i.v.
• verzamel informatie
no-shock blok
• beademing
• hartmassage
• intubatie
• (centraal) infuus
• noradrenaline 1 mg i.v.
no-shock blok
• beademing
• hartmassage
• verifieer asystolie
• intubatie; (centraal) infuus
• noradrenaline 1 mg i.v.
• overweeg pacemaker
VF/VT zonder pulsaties
ritmebewaking en pulsatiecontrole
ritmebewaking en pulsatiecontrole
SHOCK BLOK 360 j 360 j - 360 j
na 3 shock blokken
• antiarrhythmicum
• lidocaïne 1 mg/kg
• amiodarone
• procaïnamide
• natriumbicarbonaat
no-shock blok
• beademing
• hartmassage
• intubatie
• (centraal) infuus
• noradrenaline 1 mg i.v. elke 3-5 minuten
• verzamel informatie bloedgas, elektrolyten, HB
• bespreek hypothesen
no-shock blok
• beademing
• hartmassage
• noradrenaline 1 mg i.v. elke 3-5 minuten
• verzamel informatie bloedgas, elektrolyten, HB
• bespreek hypothesen
• vraag extra diagnostiek: 12-kanaals EGG, echo, X-thorax
no-shock blok
• beademing
• hartmassage
• noradrenaline 1 mg i.v. elke 3-5 minuten
• verzamel informatie bloedgas, elektrolyten, HB
• bespreek hypothesen
• vraag extra diagnostiek: 12-kanaals EGG, echo, X-thorax